RMC
Rochester Midland Corporation®

Solutions durables pour la santé, la productivité et l'environnement.

Kills SARS-CoV-2 COVID-19
60 Seconds

Quat Plus TB

Vaporisateur désinfectant et détergent

ISSA MEMBER
BSCAI
aashe
APPA

Quat Plus TB

Kills SARS-CoV-2 COVID-19
60 Seconds

Utilisation

Quat Plus TB a été spécialement conçu pour les institutions, les écoles et les universités, les institutions commerciales et industrielles, les églises, les salles de classe, les collèges communautaires, les universités, les installations sportives et les vestiaires, les salles de sport, les équipements de sport, les gymnases, les salles de spectacles. et d'autres institutions où le ménage est d'une importance primordiale. Produit virucide qui nettoie et désinfecte efficacement (efficacité prouvée contre le VIH (virus du sida) lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions.) Son action désinfectante sur les surfaces dures réduit les risques de contamination croisée. Empêche les odeurs engendrées par la moisissure.

Bénéfices

- Élimine les odeurs
- Tue 99,9 % des bactéries
- Economique et rapide lorsqu'il est utilisé avec un pulvérisateur
- Parfum de citron
- Nettoie, désinfecte et désodorise les surfaces inanimées dures et non poreuses en une seule étape*.

Mode d'emploi

DÉSINFECTION, DÉSODORISATION ET NETTOYAGE - Enlevez les saletés visibles ou la saleté épaisse avant l'application de Quat Plus TB. Positionnez le contenant à une distance de six à huit pouces de la surface à traiter. Vaporisez la zone jusqu'à ce qu'elle soit recouverte de la solution. Laissez le produit pénétrer et la surface humide pendant 3 minutes (pour les pathogènes à diffusion hématogène : laissez la surface humide pour le VIH-1 1 minute et pour le VHB et le VHC 5 minutes). Aucun lavage n'est nécessaire. Essuyez avec un chiffon propre, une vadrouille ou une éponge. Le produit ne laisse ni particules, ni résidus de savon.

NETTOYAGE ET DISIFECTION DES CUVETTES DE TOILETTE ET URINOIRS : Enlevez l'eau de la cuvette en repoussant l'eau à travers le siphon avec un balai de toilettes. Appuyez le balai de toilettes contre le bord de la cuvette pour y éliminer l'excès d'eau. Appliquez uniformément 1 à 2 oz / 30 à 60 ml de Quat Plus TB, et pour une efficacité maximale laissez suffisamment de temps au produit pour recouvrir la surface totale de la cuvette. Nettoyez complètement la cuvette avec une brosse à récurer ou un balai de toilettes en vous assurant de passer sous le rebord. Laissez le produit pendant 3 minutes (pour les pathogènes à diffusion hématogène : laissez la surface humide pour le VIH-1 1 minute et pour le VHB et le VHC 5 minutes) puis tirez la chasse d'eau.

DESINFECTER LES LOCAUX DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE : Avant d'utiliser Quat Plus TB, retirez soigneusement les produits alimentaires et les matériaux d'emballage. Pour les sols, les murs et les aires de stockage, maintenez le contenant à une distance de six à huit pouces de la surface à traiter et vaporisez jusqu'à ce qu'elle soit recouverte de la solution. Laissez Quat Plus TB pénétrer et la surface humide pendant 3 minutes (pour les pathogènes à diffusion hématogène : laissez la surface humide pour le VIH-1 1 minute et pour le VHB et le VHC 5 minutes). Essuyez avec un chiffon, une vadrouille ou une éponge propre et rincez soigneusement toutes les surfaces de la zone à l'eau potable. Les zones très sales doivent être préalablement nettoyées avant d'utiliser ce produit.

POUR DÉSINFECTER LES SURFACES EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS DANS LA RESTAURATION ET LES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES : Avant d'utiliser Quat Plus TB, retirez ou protégez soigneusement les produits alimentaires et les matériaux d'emballage. Pour les comptoirs, l'électroménager, et les tables, tenir le contenant à une distance de six à huit pouces de la surface à traiter et vaporiser jusqu'à ce qu'elle soit recouverte de la solution. Laissez Quat Plus TB pénétrer et la surface humide pendant 3 minutes (pour les pathogènes à diffusion hématogène : laissez la surface humide pour le VIH-1 1 minute et pour le VHB et le VHC 5 minutes). Essuyez avec un chiffon, une vadrouille ou une éponge propre et rincez soigneusement toutes les surfaces de la zone à l'eau potable. Les zones très sales doivent être préalablement nettoyées avant d'utiliser ce produit. Ne pas utiliser sur des ustensiles de cuisine, de la verrerie ou la batterie de cuisine.

DESINFECTION DES CHENILS ET LOCAUX POUR ANIMAUX : Avant d'utiliser Quat Plus TB, retirez des lieux les animaux et leurs nourritures. Enlevez la litière et les excréments des sols, des murs et des surfaces des installations occupées ou traversées par des animaux Videz les abreuvoirs, les râteliers et les autres dispositifs d'alimentation et d'abreuvement. Nettoyez soigneusement toutes les surfaces avec du savon ou du détergent et rincez à l'eau. Appliquez Quat Plus TB pour la désinfection des chenils et locaux pour animaux préalablement nettoyés. Saturez les surfaces avec Quat TB Plus pendant 3 minutes (pour le virus de la diarrhée virale bovine (BVDV) pendant 5 minutes) (pour le calicivirus félin et le virus de la rage pendant 30 secondes) (pour le parvovirus canin 10 minutes). Aérez le bâtiment et les autres espaces fermés. Laissez les animaux à distance et n'utilisez pas d'équipement tant que le traitement n'a pas été absorbé, fixé ou séché. Le matériel traité qui entrera en contact avec les aliments ou l'eau potable des animaux doit être rincé à l'eau potable avant d'être réutilisé.

Propriétés	
Couleur	Bleu clair
Parfum	Frais, propre
Viscosité	Eau, clair
COV (% par poids) Méthode 24 de l'EPA	0,5 %
pH (Concentré)	8,2
Facilement biodégradable	Oui
Sans phosphate	Oui

Formats	Code	
Caisse 6x1 grande bouteille	#11789314	
Caisse 4x1 gallons	#11789327	
Seau de 5 gallons	#11789345	
Bidon de 55 gallons	#11789357	
fourre-tout de 275 gallons	#11789330	

Pour information sur la manipulation et les mesures de précaution, vous référer à l'étiquette du produit et à la fiche signalétique.

Pour plus d'informations sur l'appel 1.800.387.7174 de RMC ou allez à www.rochestermidland.com

Coordonnées du distributeur

Il est considéré que toutes les données et tous les renseignements figurant dans le présent document sont exacts et fiables, mais sont présentés sans garantie ou prise de responsabilité de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à la qualité marchande ou à l'adaptation à une utilisation quelconque du produit. Le vendeur n'assume aucune responsabilité juridique à leur égard et ceux-ci sont offerts seulement pour fins d'examen, considération et vérification. Les énoncés et suggestions concernant les utilisations possibles de ce produit sont formulés sans déclaration de responsabilité ou garantie que de telles utilisations sont exemptes des règlements relatifs à la contrefaçon de brevet et ne doivent pas être considérés comme des recommandations qui pourraient contrevenir à un ou des brevets. Imprimé aux États-Unis. Copyright © 2020 Rochester Midland Corporation. Fiche #117893(11/9/23)
EPA Reg # 1839-83-527

Quat Plus TB

Données d'efficacité

EFFICACY TESTS HAVE DEMONSTRATED THAT QUAT PLUS TB IS AN EFFECTIVE BACTERICIDE, FUNGICIDE, AND VIRUCIDE IN THE PRESENCE OF ORGANIC SOIL (5% BLOOD SERUM).

Using approved AOAC test methods (under Good Laboratory Practices), in the presence of 5% blood serum and a 3 minute contact time, unless otherwise noted, Quat Plus TB kills the following organisms on hard non-porous inanimate surfaces:
BACTERICIDAL ACTIVITY:
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)
Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
Salmonella (choleraesuis) enterica (ATCC 10708)
Escherichia coli (ATCC 11229)
Escherichia coli O157:H7 (ATCC 43895)
Streptococcus pyogenes (Necrotizing Fasciitis-Group A) (V.A. Medical Center Isolate 04001)
Listeria monocytogenes (ATCC 35152)
Yersinia enterocolitica (ATCC 23715)
Enterococcus faecium (ATCC 6569)
Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6871)
Salmonella (typhi) enterica (ATCC 6539)

ANTIBIOTIC-RESISTANT BACTERICIDAL ACTIVITY:
Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (ATCC 33593)
Vancomycin resistant Enterococcus faecalis (VRE) (ATCC 51575)
Vancomycin intermediate resistant Staphylococcus aureus (VISA) (CDC Isolate 99287)
Methicillin resistant Staphylococcus epidermidis (MRSE) (ATCC 51625)
Community Associated Methicillin resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) (NRS 123) Geno-type USA400
Community Associated Methicillin resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) (NRS 384) Geno-type USA300

TUBERCULOCIDAL ACTIVITY - Quat Plus TB exhibits disinfectant efficacy against Mycobacterium tuberculosis BCG (Mycobacterium bovis) at 20 degrees Centigrade (20°C) when the treated surface is allowed to remain wet for 5 minutes.

*VIRUCIDAL ACTIVITY - Quat Plus TB kills on hard, non-porous inanimate surfaces when allowed to remain wet for a 10 minute contact time against:
Canine Parvovirus (ATCC VR-2017)
Hepatitis A Virus (HAV) (University of Ottawa)
Poliovirus Type 1 (ATCC VR-1000)

Quat Plus TB, when used on environmental, inanimate hard surfaces, with 2 minute contact time, exhibits virucidal activity against:
Human Coronavirus (ATCC VR-740)
SARS associated Coronavirus (ZeptoMetrix)
Avian Influenza A strain H3N2 (ATCC VR-2072)
Avian Influenza A strain H9N2

Quat Plus TB, when used on environmental, inanimate hard surfaces, with 3 minute contact time, exhibits virucidal activity against:
Paramyxovirus (Mumps) (ATCC VR-1438)
Rhinovirus type 39 (ATCC VR-340)
Rotavirus (University of Ottawa)

Quat Plus TB when used on environmental, inanimate hard surfaces, with 1 minute contact time, exhibits virucidal activity against:
HIV-1 (associated with AIDS)
SARS - CoV-2 (COVID19)

Quat Plus TB when used on environmental, inanimate hard surfaces, with 5 minute contact time, exhibits virucidal activity against:
Hepatitis B Virus (HBV)
Hepatitis C Virus (HCV)
Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) (NVSL)

Quat Plus TB when used on environmental, inanimate hard surfaces, with 30 seconds contact time, exhibits virucidal activity against:
Norovirus (Norwalk virus)
Feline Calicivirus
Rabies Virus

Quat Plus TB has demonstrated effectiveness against Influenza A virus and is expected to inactivate all Influenza A viruses including Pandemic 2009 H1N1 Influenza A virus.

Quat Plus TB has demonstrated effectiveness against viruses similar to monkeypox on hard, non-porous surfaces. Therefore, Quat Plus TB can be used against monkeypox when used in accordance with the directions for use against Canine parvovirus, Poliovirus, and Hepatitis A virus on hard, non-porous surfaces. Refer to the CDC website at www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html for additional information.

KILLS HIV-1, HBV AND HCV ON PRE-CLEANED ENVIRONMENTAL SURFACES/OBJECTS PREVIOUSLY SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS in health care settings (Hospitals, Nursing Homes) or other settings in which there is an expected likelihood of soiling of inanimate surfaces/objects with blood or body fluids, and in which the surfaces/ objects likely to be soiled with blood or body fluids with the potentiaLfor transmission of-Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) (associated with AIDS), Hepatitis B Virus (HBV), and Hepatitis C Virus (HCV).

SPECIAL INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND DECONTAMINATION AGAINST HIV-1, HBV and HCV ON SURFACES/OBJECTS SOILED WITH BLOOD/BODY FLUIDS.
PERSONAL PROTECTION: When handling items soiled with blood or body fluids use disposable latex gloves, gowns, masks, and eye coverings.
CLEANING PROCEDURES: Blood and other body fluids must be thoroughly cleaned from surfaces and objects before application of this product.
CONTACT TIME: Allow surface to remain wet for HBV and HCV 5 minutes, for HIV-1 1 minute. These contact times will not control other common types of viruses and bacteria.
DISPOSAL OF INFECTIOUS MATERIALS: Blood and other body fluids must be autoclaved and disposed of according to local regulations for infectious waste disposal.

FUNGICIDAL ACTIVITY -Quat Plus TB is fungicidal against the pathogenic fungus, Trichophyton mentagrophytes (ATCC 9533) (Athlete's Foot Fungus), a cause of ringworm of the foot, when used with a 10 minute contact time on clean, non-porous, hard surfaces as found in bathrooms, shower stalls, locker rooms, or other areas commonly contacted by bare feet.

MILDEWSTAT - To control mold and mildew on pre-cleaned, hard, non-porous surfaces spray surface to be treated making sure to wet completely. Let air dry. Repeat application at weekly intervals or when mildew growth appears.

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Labeling must be in the possession of the user at the time of using the product. See container label for FIRST AID and PRECAUTIONARY STATEMENTS and complete DIRECTIONS for USE before applying. Use of this product is subject to the precautions and limitations imposed by the label affixed to the container for this product.